

# 41-й Международный математический Турнир городов

## 2019/20 учебный год

### Решения задач

#### Сложный вариант

#### Младшие классы

1. Назовём *сложностью* целого числа  $n > 1$  количество сомножителей в его разложении на простые. Для каких  $n$  все числа между  $n$  и  $2n$  имеют сложность

- а) [2] не больше, чем у  $n$ ;
- б) [2] меньше, чем у  $n$ ?

(Б. Френкин)

**Ответ.** а) Для  $n = 2^k$ ; б) таких чисел нет.

**Решение.** а) Очевидно,  $2^k$  – наименьшее число сложности  $k$ . Поэтому все числа между  $2^k$  и  $2^{k+1}$  имеют сложность не больше  $k$ . Пусть  $n$  – не степень двойки. Тогда между  $n$  и  $2n$  есть степень двойки (можно взять наибольшую степень двойки, меньшую  $n$ , и удвоить её). Очевидно, её сложность больше, чем у  $n$ .

б) В силу пункта а), достаточно рассмотреть случай  $n = 2^k$ , где  $k$  натуральное. Но число  $3 \cdot 2^{k-1}$  имеет такую же сложность, как и  $n$ , и находится между  $n$  и  $2n$ .

**Замечание для знатоков.** Утверждение б) следует также из постулата Бертрана: если  $p$  – простое число, то следующее простое меньше  $2p$ . Действительно, представим  $n$  в виде  $pr$ , где  $p$  – простое,  $r$  – натуральное. Пусть  $q$  – следующее за  $p$  простое число. Тогда  $n < qr < 2n$ , а сложность  $qr$  равна сложности  $n$ .

2. [7] Два остроугольных треугольника  $ABC$  и  $A_1B_1C_1$  таковы, что точки  $B_1$  и  $C_1$  лежат на стороне  $BC$ , а точка  $A_1$  – внутри треугольника  $ABC$ . Пусть  $S$  и  $S_1$  – соответственно площади этих треугольников. Докажите, что  $\frac{S}{AB + AC} > \frac{S_1}{A_1B_1 + A_1C_1}$ .

(Н. Седракян, И. Богданов)

**Решение.** Пусть точки  $D$  и  $D_1$  симметричны точкам  $A$  и  $A_1$  относительно  $BC$ . Проведём биссектрисы  $AK$  и  $A_1K_1$  наших треугольников. Заметим, что  $K$  и  $K_1$  – центры окружностей, вписанных в четырёхугольники  $ABDC$  и  $A_1B_1D_1C_1$ , а требуемое неравенство превратилось в очевидное неравенство  $r > r_1$ , где  $r$  и  $r_1$  – радиусы указанных окружностей.

3. [7] Есть 100 внешне неразличимых монет трёх типов: золотые, серебряные и медные (каждый тип встречается хотя бы раз). Известно, что золотые весят по 3 г, серебряные – по 2 г, медные – по 1 г. Как на чашечных весах без гирек определить тип у всех монет не более чем за 101 взвешивание?

(В. Новиков)

**Решение 1.** (А. Шаповалов) Назовём ситуацию *победной*, если проведено не более чем  $k + 1$  взвешивание и определены веса  $k$  монет, причём среди них есть серебряная или две медные. В победной ситуации, сравнивая неизвестную монету с весом 2 г, мы определим её вес, увеличив число известных монет и число взвешиваний на единицу и так определим все монеты не более чем за 101 взвешивание.

В каждый момент будем сравнивать число *затронутых* (участвовавших во взвешиваниях) монет  $z$  с числом взвешиваний  $v$ . Сначала выделим одну монету и будем сравнивать незатронутые монеты с ней, пока не найдём монету другого веса. Пусть  $A$  – более лёгкая, а  $B$  – более тяжёлая из затронутых монет. Далее сравниваем незатронутые монеты с  $B$ , пока снова не получим неравенство. Теперь у нас  $v = z - 1$ ; есть одна или несколько монет одинакового веса  $a$ , одна или несколько монет другого веса  $b > a$  и одна монета  $C$  веса  $c \neq b$ . Сравним  $C$  с  $A$ . Возможны два случая.

1)  $c = a$ . Сравним  $B$  с  $A+C$ , то есть  $b$  с  $2a$ . Возможны варианты:  $b = 3$ ,  $a = 1$  (если  $b > 2a$ );  $b = 2$ ,  $a = 1$  ( $b = 2a$ );  $b = 3$ ,  $a = 2$  ( $b < 2a$ ). Во всех случаях ситуация победная:  $v = z + 1$ , веса  $z$  монет определены и есть нужные монеты (с общим весом 2).

2)  $c \neq a$ . Значит  $a, b, c$  – три разных веса, они как-то упорядочены ( $c > b > a$ ,  $b > c > a$  или  $b > a > c$ ), поэтому определены однозначно. При этом  $v = z$  – ситуация победная.

**Замечание.** При определенных условиях некоторые взвешивания можно не проводить: например, если  $C$  тяжелее  $B$ , то уже  $c > b > a$ ; если при первом неравенстве уже есть ещё монета веса  $a$ , ей можно воспользоваться как монетой  $C$ .

**Решение 2.** (A. Рябичев) Сначала докажем по индукции следующее вспомогательное

**Утверждение 1.** Пусть есть  $k$  монет, среди которых все три типа представлены, причём про пару монет  $A, a$  уже известно, что  $A > a$ . Тогда можно определить, какая из  $k$  монет какого типа, за  $k - 1$  взвешивание.

*База.* Если монет три, сравнив оставшуюся монету с  $A$  и с  $a$ , мы упорядочим их по весу.

*Шаг.* Сравним какие-нибудь две монеты, кроме  $A$  и  $a$ . Если они равны, то одну можно отбросить (запомнив, с какой она совпадает по весу), и воспользоваться предположением индукции для  $k - 1$  монеты.

Если они не равны, скажем что получилась пара  $B > b$ . Теперь сравним  $A+a$  и  $B+b$ .

Если веса пар равны, то  $A=B$  и  $a=b$ , так что мы можем выкинуть  $B$  и  $b$  (запомнив, что они совпадают по весу с  $A$  и  $a$ ), и воспользоваться предположением индукции для  $k - 2$  монет.

Пусть веса пар различны, для определённости,  $A+a > B+b$ . Заметим, что при этом обязательно  $A = 3$  и  $b = 1$ . Монеты в паре  $(B, a)$  имеют либо веса  $(2,1)$ , либо  $(2,2)$ , либо  $(3,2)$ . Таким образом, сравнив  $A+b$  с  $B+a$ , мы однозначно восстановим веса всех четырёх монет. Среди них есть монета веса 2, будем сравнивать с ней все остальные монеты, на что уйдут оставшиеся  $k - 4$  взвешивания. Утверждение 1 доказано.

Теперь выведем по индукции следующее утверждение, усиливающее требуемое в задаче:

**Утверждение 2.** Если есть  $k$  монет, среди которых все три типа представлены, то можно определить, какая монета какого типа, за  $k$  взвешиваний.


*База.* Если монет три, то, сравнив каждую с каждой, мы упорядочим их по весу.

*Шаг.* Сравним какие-нибудь две монеты. Если они равны, то одну можно отбросить (запомнив, с какой она совпадает по весу), и мы переходим к случаю  $k - 1$  монеты, среди которых все типы представлены. Если они не равны, скажем что образовалась пара  $A > a$  и воспользуемся утверждением 1.

**Замечание.** Мы сделали на одно взвешивание меньше, чем предполагалось в условии. Кроме того, мы использовали только то, что сумма весов двух серебряных монет равна сумме весов медной и золотой; тот факт, что серебряная монета вдвое тяжелее медной, для данного решения не важен.

4. [7] Из центра  $O$  описанной окружности треугольника  $ABC$  опустили перпендикуляры  $OP$  и  $OQ$  на биссектрисы внутреннего и внешнего углов при вершине  $B$ . Докажите, что прямая  $PQ$  делит пополам отрезок, соединяющий середины сторон  $CB$  и  $AB$ .

(A. Соколов)



**Решение.** Проведём гомотетию с центром  $B$  и коэффициентом 2. Точка  $O$  перейдёт в точку  $D$ , диаметрально противоположную вершине  $B$  на описанной окружности  $\Omega$ , точка  $P$  – в точку  $R$  пересечения биссектрисы угла  $B$  с  $\Omega$ , точка  $Q$  – в диаметрально противоположную  $R$  точку  $S$ , «отрезок, соединяющий...» – в сторону  $AC$ . Осталось заметить, что диаметр  $RS$  проходит через середину стороны  $AC$ , так как  $R$  – середина дуги  $AC$ .

**5. [8]** Назовём пару  $(m, n)$  различных натуральных чисел  $m$  и  $n$  *хорошой*, если  $mn$  и  $(m+1)(n+1)$  – точные квадраты. Докажите, что для каждого натурального  $m$  существует хотя бы одно такое  $n > m$ , что пара  $(m, n)$  хорошая.

(Ю. Маркелов)

**Решение.** Пара  $(m, m(4m+3)^2)$  хорошая. Действительно,  $(m+1)(m(4m+3)^2 + 1) = (m+1)(16m^3 + 24m^2 + 9m + 1) = (m+1)^2(16m^2 + 8m + 1) = ((m+1)(4m+1))^2$ .

**Путь к решению.** Естественно попытаться найти такое  $n$ , что оно есть квадрат, умноженный на  $m$ , и при этом  $n+1$  есть квадрат, умноженный на  $m+1$ . Тогда  $n+1$  имеет вид  $k^2(m+1)$ . Так как  $n$ , поделённое на  $m$ , тоже квадрат, имеем:  $(k^2(m+1) - 1)/m = k^2 + (k^2 - 1)/m$  – квадрат. Самый простой способ это обеспечить – положить  $(k^2 - 1)/m$  равным  $4k+4$ , тогда  $(k-1)/m = 4$ , откуда  $k = 4m+1$ .

**6. [9]** У Пети было несколько сторублёвок, других денег не было. Петя стал покупать книги (каждая книга стоит целое число рублей) и получать сдачу мелочью (монетами в 1 рубль). При покупке *дорогой* книги (не дешевле 100 рублей) Петя расплачивался только сторублёвками (минимальным необходимым их количеством), а при покупке *дешёвой* (дешевле 100 рублей) расплачивался мелочью, если хватало, а если не хватало – сторублёвкой. К моменту, когда сторублёвок не осталось, Петя потратил на книги ровно половину своих денег. Мог ли Петя потратить на книги хотя бы 5000 рублей?

(Т. Казицына)

**Решение 1.** Посмотрим, сколько мелочи Петя мог получить.

Рассмотрим самую последнюю дешёвую покупку, которая увеличила количество мелочи. Пусть стоимость этой покупки  $x$ , тогда перед этим было не более  $x-1$  рублей мелочи, а значит, после этого её станет не больше чем  $x-1+100-x=99$  рублей. Так как дорогие покупки количество мелочи не уменьшают, то все предыдущие покупки вместе с рассмотренной дали в сумме не более 99 руб. мелочи. Тем более все *дешёвые* покупки в сумме принесли не более 99 рублей.

Пусть дорогих покупок  $n$ . Каждая из них добавляет не более 99 рублей мелочи. Если бы дешёвых покупок совсем не было, то на дорогие было бы потрачено не менее  $2n$  сотен, а сдача составила бы не более  $99n$  – меньше половины потраченного. Поэтому дешёвые есть. Но тогда у Пети было не менее  $2n+1$  сторублёвки, а мелочи в конце стало не больше  $99n+99$ . Значит,  $(2n+1)50 \leq 99n+99$ , откуда  $n \leq 49$ . Таким образом, мелочи останется не более  $99 \cdot 49 + 99 < 5000$  руб. Значит, и потрачено менее 5000 рублей.

**Решение 2.** Пусть какой-то товар куплен за  $x$  рублей мелочью. Эта мелочь появилась как сдача при предыдущих покупках. Увеличим стоимость этих покупок на соответствующие величины, в сумме составляющие  $x$  рублей, а данную покупку отменим. Аналогично избавимся от всех покупок за мелочь. На каждом шаге количество мелочи уменьшается, поэтому новых покупок за мелочь не появится.

Имеется покупка стоимостью не больше 50 рублей (*маленькая*), иначе осталось бы меньше половины всех денег. Маленькая покупка только одна, так как вторая маленькая покупка была бы сделана на сдачу за первую, а покупка за мелочь теперь нет.


Разность между сдачей за маленькую покупку и её ценой не больше  $99 - 1 = 98$  руб. Для каждой другой покупки эта разность отрицательна, и она чётна (так как сумма цены и сдачи кратна 100, то есть чётна). Значит, эта разность не меньше  $-98$  и не больше  $-2$ . Поэтому остальных покупок не больше  $98:2 = 49$ , и за каждую из них отдано не больше двух сторублёвок (иначе указанная разность не больше  $99 - 201 < -98$ ). Следовательно, всего сторублёвок было не больше  $1 + 2 \cdot 49 = 99$ , а половина от этой суммы не больше  $9900:2 < 4950$ .

**7. [10]** В клетчатом деревянном квадрате 102 клетки намазаны чёрной краской. Петя, используя квадрат как печать, 100 раз приложил его к белому листу, и каждый раз эти 102 клетки (и только они) оставляли чёрный отпечаток на бумаге. Мог ли в итоге на листе получиться квадрат  $101 \times 101$ , все клетки которого, кроме одной угловой, чёрные?


(А. Грибалко)

**Ответ.** Мог. **Решение.** Покажем, что любой квадрат  $(2N+1) \times (2N+1)$  без угловой клетки можно получить,  $2N$  раз приложив печать из  $2N+2$  клеток. Для пояснения приведём рисунок для  $N=4$ .

Квадрат без правого верхнего угла представим как квадрат  $2N \times 2N$  с двумя приклёпанными сверху и справа полосками  $1 \times 2N$ . Разобьём квадрат  $2N \times 2N$  на четыре квадратика  $N \times N$ . Покрасим левый нижний и правый верхний квадратики  $N \times N$  и верхнюю полоску в серый цвет. Теперь белая часть получается из серой поворотом на  $90^\circ$  по часовой стрелке (относительно центра квадрата  $2N \times 2N$ ). Левый край каждого серого квадратика  $N \times N$  и две клетки серой полоски на тех же вертикалях сделаем тёмными. Это будет первый отпечаток. Сдвинув его вправо на одну клетку, сделаем второй отпечаток, и т.д. Тогда  $N$  отпечатков покроют в точности серую область. Развернув печать на  $90^\circ$ ,  $N$  отпечатками покроем белую область.



**Замечание.** Есть и другие варианты печатей. Например, такой (для простоты рассмотрен случай  $N=3$ ):



## Старшие классы

**1. [5]** Многочлен  $P(x, y)$  таков, что для всякого целого  $n \geq 0$  каждый из многочленов  $P(n, y)$  и  $P(x, n)$  либо тождественно равен нулю, либо имеет степень не выше  $n$ . Может ли многочлен  $P(x, x)$  иметь нечётную степень?

(Б. Френкин)

**Ответ.** Не может. **Решение.** Пусть наибольшая степень, в которой встречается  $x$ , равна  $m$ , а наибольшая степень, в которой встречается  $y$ , равна  $n$ . Для определенности положим  $n \geq m$ . Запишем многочлен  $P(x, y)$  в виде  $A(x)y^n + B(x)y^{n-1} + \dots$ , где  $A(x), B(x), \dots$  – многочлены от  $x$ . Поскольку при всех  $k < n$  степень многочлена  $P(k, y) = A(k)y^n + B(k)y^{n-1} + \dots$  меньше  $n$ , то  $A(0) = A(1) = \dots = A(n-1) = 0$ . У многочлена  $A(x)$  есть  $n$  различных корней, поэтому его степень не меньше  $n$ . Но она не больше  $m$ , значит,  $m = n$ . При этом одночлен  $x^n y^n$  заведомо встречается в произведении  $A(x)y^n$  и не встречается в остальных произведениях, поэтому  $\deg P(x, x) = 2n$ .


**Замечание.** Можно показать, что условию задачи удовлетворяют все многочлены следующего вида и только они:  $c_0 + xy(c_1 + (x-1)(y-1)(c_2 + \dots + (c_k + ((x-k)(y-k)c_{k+1})\dots))$ , где  $k$  – неотрицательное целое число,  $c_0, \dots, c_{k+1}$  – константы.

**2. [5]** Отрезки  $AA'$ ,  $BB'$  и  $CC'$  с концами на сторонах остроугольного треугольника  $ABC$  пересекаются в точке  $P$  внутри треугольника. На каждом из этих отрезков как на диаметре построена окружность, в которой перпендикулярно этому диаметру проведена хорда через точку  $P$ . Оказалось, что три проведённые хорды имеют одинаковую длину. Докажите, что  $P$  – точка пересечения высот треугольника  $ABC$ .

(Г. Гальперин)

**Решение.** Пусть  $2x$  – длина указанных хорд. По теореме о произведении отрезков хорд  $x^2 = AP \cdot A'P = BP \cdot B'P = CP \cdot C'P$ . По обратной теореме точки  $A, A', B$  и  $B'$  лежат на одной окружности. Значит,  $\angle AA'B = \angle AB'B$ .

Аналогично  $\angle AA'C = \angle AC'C$ ,  $\angle BB'C = \angle BC'C$ . Следовательно,  $\angle AA'B = \angle AB'B = 180^\circ - \angle BB'C = 180^\circ - \angle BC'C = \angle AC'C = \angle AA'C$ , т.е.  $AA'$  – высота. Аналогично  $BB'$  и  $CC'$  – высоты.



**3. [6]** См. задачу 3 мл. классов.

**4. [10]** Данна возрастающая последовательность положительных чисел

$$\dots < a_{-2} < a_{-1} < a_0 < a_1 < a_2 < \dots,$$

бесконечная в обе стороны. Пусть  $b_k$  – наименьшее целое число со свойством: отношение суммы любых  $k$  подряд идущих членов данной последовательности к наибольшему из этих  $k$  членов не превышает  $b_k$ . Докажите, что последовательность  $b_1, b_2, b_3, \dots$  либо совпадает с натуральным рядом  $1, 2, 3, \dots$ , либо с некоторого момента постоянна.

(И. Митрофанов)

**Решение.** (А. Шаповалов) Очевидно, что  $b_1=1$ , а при  $k > 1$  отношение из условия меньше  $k$ , поэтому  $b_k \leq k$  при всех  $k$ . Если последовательность  $b_1, b_2, b_3, \dots$  не совпадает с натуральным рядом, то  $b_{k+1} \leq k$  при некотором  $k$ . Тогда  $a_i + a_{i+1} + \dots + a_{i+k} \leq k \cdot a_{i+k}$  для каждого целого  $i$ , откуда  $(k+1)a_i < k \cdot a_{i+k}$ , то есть  $\frac{a_i}{a_{i+k}} < \frac{k}{k+1}$ . Обозначим  $t = \frac{k}{k+1} < 1$ .

Чтобы оценить сверху произвольное  $b_{n+1}$ , оценим сверху

$$\frac{a_i + a_{i+1} + \dots + a_{i+n}}{a_{i+n}} = \frac{a_i}{a_{i+n}} + \frac{a_{i+1}}{a_{i+n}} + \dots + \frac{a_{i+n}}{a_{i+n}} \quad (*).$$

Разделив  $n$  на  $k$  с остатком,  $n=kq+r$ , получаем тогда для первого слагаемого:

$$\frac{a_i}{a_{i+n}} = \frac{a_i}{a_{i+k}} \cdot \frac{a_{i+k}}{a_{i+2k}} \cdot \dots \cdot \frac{a_{i+(q-1)k}}{a_{i+qk}} \cdot \frac{a_{i+qk}}{a_{i+n}} < t \cdot t \cdot \dots \cdot t \cdot 1 = t^q.$$

Аналогично записываем и оцениваем второе слагаемое, и т.д. Ясно, что не более  $k$  подряд идущих слагаемых в (\*) мы оценим сверху числом  $t^q$ , не более  $k$  подряд идущих слагаемых – числом  $t^{q-1}$ , и так далее, откуда левая часть неравенства (\*) не превосходит  $k \cdot (1 + t + t^2 + \dots) = \frac{k}{1-t} = k(k+1)$ . Это значит, что все  $b_1, b_2, b_3, \dots$  не превосходят  $k(k+1)$ .

Поскольку последовательность  $b_1, b_2, b_3, \dots$ , очевидно, не убывает, то она стабилизируется на числе, не большем  $k(k+1)$ .

**5.** Точка  $M$  лежит внутри выпуклого четырёхугольника  $ABCD$  на одинаковом расстоянии от прямых  $AB$  и  $CD$  и на одинаковом расстоянии от прямых  $BC$  и  $AD$ . Оказалось, что площадь четырёхугольника  $ABCD$  равна  $MA \cdot MC + MB \cdot MD$ . Докажите, что четырёхугольник  $ABCD$

**a)** [6] вписанный; **б)** [6] описанный.

(*H. Седракян*)

**Решение.** **а)** Опустим перпендикуляры  $MP, MQ, MR, MT$  на прямые  $AB, BC, CD, DA$  соответственно. Тогда  $S_{ABCD} = S_{AMB} + S_{BMC} + S_{CMD} + S_{DMA} \leq (S_{AMP} + S_{BMP}) + (S_{BMQ} + S_{CMQ}) + (S_{CMR} + S_{DMR}) + (S_{DMS} + S_{AMT}) = (S_{AMP} + S_{CMR}) + (S_{BMP} + S_{DMR}) + (S_{BMQ} + S_{DMT}) + (S_{CMQ} + S_{AMT})$ . Заметим, что прямоугольные треугольники  $AMP$  и  $CMR$  имеют равные катеты  $MP$  и  $MR$ , поэтому из них можно сложить треугольник  $\Delta$ , две стороны которого равны  $MA$  и  $MC$ , а значит,  $S_{AMP} + S_{CMR} = S_{\Delta} \leq \frac{1}{2} MA \cdot MC$ . Аналогично  $S_{BMP} + S_{DMR} \leq \frac{1}{2} MB \cdot MD$ ,  $S_{BMQ} + S_{DMS} \leq \frac{1}{2} MB \cdot MD$ ,  $S_{CMQ} + S_{AMS} \leq \frac{1}{2} MA \cdot MC$ .

Следовательно,  $S_{ABCD} \leq MA \cdot MC + MB \cdot MD$ . Из условия видно, что все предыдущие неравенства на самом деле являются равенствами. Это значит, что, во-первых, точки  $P, Q, R, T$  лежат на соответствующих сторонах четырёхугольника и, во-вторых, треугольник  $\Delta$  прямоугольный, то есть  $\angle MAP + \angle MCR = 90^\circ$ . Аналогично  $\angle MAD + \angle MCQ = 90^\circ$ , откуда  $\angle BAD + \angle BCD = (\angle MAP + \angle MCR) + (\angle MAT + \angle MCQ) = 180^\circ$ , то есть четырёхугольник вписанный.

**б)** Из прямоугольного треугольника  $\Delta$  (см. **а**) видно, что  $AP + RC = \sqrt{MA^2 + MC^2}$ . Аналогично  $BP + RD = \sqrt{MB^2 + MD^2}$ . Тогда  $AB + CD = \sqrt{MA^2 + MC^2} + \sqrt{MB^2 + MD^2}$ . Вычисляя похожим образом сумму  $BC + DA$ , мы получим тот же результат.

**Замечание.** Площадь любого вписано-описанного четырёхугольника  $ABCD$  равна  $MA \cdot MC + MB \cdot MD$ , где  $M$  – центр вписанной окружности четырёхугольника  $ABCD$ .

**6.** Куб, состоящий из  $(2n)^3$  единичных кубиков, проткнут несколькими спицами, параллельными рёбрам куба. Каждая спица проходит ровно  $2n$  кубиков, каждый кубик проткнут хотя бы одной спицей.

**а)** [6] Докажите, что можно выбрать такие  $2n^2$  спиц, идущих в совокупности всего в одном или двух направлениях, что никакие две из этих спиц не протыкают один и тот же кубик.

**б)** [6] Какое наибольшее количество спиц можно гарантированно выбрать из имеющихся так, чтобы никакие две выбранные спицы не протыкали один и тот же кубик?

(*H. Гладков, A. Зимин*)

**Решение.** (*A. Шаповалов*) Пусть ребра куба параллельны осям координат.

**а)** Разобьём куб на слои толщиной 1, параллельные плоскости  $Oxy$ . Рассмотрим только спицы направлений  $Ox$  и  $Oy$ . В каждом слое найдём максимум числа таких спиц, идущих в одном направлении. Точно также найдём максимумы числа спиц для каждого слоя параллельного  $Oxz$  и параллельного  $Oyz$ . Пусть  $k$  – минимум из  $6n$  этих максимумов.

Рассмотрим слой  $K$ , где максимум равен  $k$ . В слое можно выбрать  $2n - k$  строк и  $2n - k$  столбцов, через которые не проходят спицы слоя. На пересечении выбранных рядов есть  $(2n - k)^2$  кубиков, их проходят  $(2n - k)^2$  спиц, перпендикулярных  $K$ . Покрасим эти  $(2n - k)^2$  спиц в синий цвет. Выберем грань  $P$  куба, перпендикулярную слою  $K$ .

Рассмотрим слои, параллельные  $P$  и не содержащие синих спиц. Их ровно  $k$ . В каждом таком слое можно выбрать не менее  $k$  спиц одного направления, всего не менее  $k^2$  спиц. Добавим к ним синие спицы. По известному неравенству

$$k^2 + (2n - k)^2 \geq \frac{1}{2} (k + (2n - k))^2 = 2n^2.$$

**б)** **Ответ.**  $2n^2$  спиц. Выделим в нашем кубе два меньших куба со стороной  $n$ , примыкающие к противоположным вершинам. Они состоят из  $2n^3$  единичных кубиков.

Проткнём каждый выделенный кубик тремя перпендикулярными спицами. Тогда и все невыделенные единичные кубики тоже проткнуты. Заметим, что каждая спица проходит ровно  $n$  выделенных кубиков. Значит, если спицы выбраны так, что никакой кубик не проткнут дважды, то спиц не более чем  $2n^3$ :  $n = 2n^2$ .

**7. [12]** Некоторые из чисел  $1, 2, 3, \dots, n$  покрашены в красный цвет так, что выполняется условие: если для красных чисел  $a, b, c$  (не обязательно различных)  $a(b - c)$  делится на  $n$ , то  $b = c$ . Докажите, что красных чисел не больше чем  $\phi(n)$ .

(A. Семенов)

**Лемма.** Пусть  $D$  – некоторое множество различных простых делителей числа  $n$ . Количество натуральных чисел, не превосходящих  $n$  и не кратных ни одному числу из  $D$ , равно  $n \prod_{p \in D} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$ .

**Доказательство.** Раскрыв скобки, получаем формулу включений-исключений.  $\square$

Пусть красных чисел больше  $\phi(n)$ . Тогда некоторые красные числа имеют с  $n$  общий простой делитель. Пусть  $q$  – наибольшее из таких простых и  $a$  – красное число, кратное  $q$ . Чтобы получить противоречие достаточно найти различные красные числа  $b$  и  $c$ ,

сравнимые по модулю  $\frac{n}{q}$ , а для этого достаточно показать, что  $\phi(n)$  больше количества

возможных остатков красных чисел по модулю  $\frac{n}{q}$ .

По лемме,  $\phi(n) = n \prod_{p \in D} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$ , где  $D$  – множество всех простых делителей числа  $n$ , а указанное количество остатков не больше, чем  $\frac{n}{q} \prod_{p \in D, p > q} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$ . Итак, достаточно доказать неравенство

$$n \prod_{p \in D} \left(1 - \frac{1}{p}\right) > \frac{n}{q} \prod_{p \in D, p > q} \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

Сокращая на  $n$  и на скобки, в которых  $p > q$ , получаем

$$\left(1 - \frac{1}{q}\right) \prod_{p \in D, p < q} \left(1 - \frac{1}{p}\right) > \frac{1}{q},$$

что равносильно неравенству

$$q - 1 \geq \prod_{p \in D, p < q} \frac{p}{p - 1}.$$

Оно верно, поскольку  $q - 1 = \frac{q - 1}{q - 2} \cdot \frac{q - 2}{q - 3} \cdots \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{1}$ .