

RESEARCH PROBLEMS FOR THE NATIONAL SUMMER SCHOOL 2010

DAVID ZMIAIKOU

СОДЕРЖАНИЕ

1. Числа на круге	1
2. Линейные комбинации	2
3. Многоугольники Нагеля	2
4. Четверки простых чисел-близнецов	2
5. Динамика точки, движущейся к вершинам многоугольника	3
6. Одновременная делимость	3
7. Вложение одного треугольника в другой	3
8. Наибольшие хорды многоугольников	3
9. Рептилии	4
10. Число поцелуев выпуклой фигуры	4
11. Множество кругов без трех в линию	4
12. Разность двух равна одному	4
13. Целые части степеней	4
14. Задача о соседях	4
15. Перестановки и вероятность	5
16. English version of some problems	6

1. ЧИСЛА НА КРУГЕ

В данной задаче рассматривается вопрос расстановки натуральных чисел на круге таким образом, чтобы любые несколько подряд идущих чисел обладали определенным свойством.

- a1) Найдите все $n > 1$, при которых на круге можно расставить n натуральных чисел так, чтобы для любых двух подряд идущих чисел отношение наибольшего к наименьшему было простым числом.
- a2) Даны натуральные числа a, b и $k = a + b$. Найдите все $n \geq k$, при которых на круге можно расставить n натуральных чисел так, чтобы для любых k подряд идущих чисел произведение каких-то a из них равнялось простому числу, умноженному на произведение оставшихся b чисел.
- b1) Найдите все $n > 1$, при которых на круге можно расставить n натуральных чисел так, чтобы для любых трех подряд идущих чисел одно являлось суммой двух других.
- b2) Даны натуральные числа a, b и $k = a + b$. Найдите все $n \geq k$, при которых на круге можно расставить n натуральных чисел так, чтобы для любых k подряд идущих чисел сумма каких-то a из них равнялась сумме оставшихся b чисел.
- c) Сформулируйте и исследуйте другие аналогичные задачи.

2. ЛИНЕЙНЫЕ КОМБИНАЦИИ

Комбинаторная задача об остатках линейных комбинаций элементов конечного множества целых чисел.

- а1) Даны девять различных целых чисел. Докажите, что среди них найдутся четыре различных числа a , b , c и d такие, что $a + b - c - d$ делится на 20.
- а2) Пусть N натуральное число. Найдите наименьшее натуральное $m = m(N)$, удовлетворяющее условию: из любого множества m целых чисел всегда можно выбрать четыре различных числа a , b , c и d такие, что выражение $a + b - c - d$ делится на N .
- а3) Пусть N и k натуральные числа. Найдите наименьшее натуральное $m = m(N, k)$, удовлетворяющее условию: из любого множества m целых чисел всегда можно выбрать $2k$ различных чисел a_1, \dots, a_k и b_1, \dots, b_k такие, что линейная комбинация $a_1 + \dots + a_k - b_1 - \dots - b_k$ делится на N .
- б) *Общая формулировка.* Пусть N , k и l натуральные числа. Найдите наименьшее натуральное $m = m(N, k, l)$, удовлетворяющее условию: из любого множества m целых чисел всегда можно выбрать $(k + l)$ различных чисел a_1, \dots, a_k и b_1, \dots, b_l таких, что линейная комбинация $a_1 + \dots + a_k - b_1 - \dots - b_l$ делится на N .
- с) Предложите свои обобщения и направления.

3. МНОГОУГОЛЬНИКИ НАГЕЛЯ

Рассмотрим произвольный треугольник ABC , обозначим через A_1 , B_1 и C_1 точки касания вневписанных окружностей к треугольнику, лежащие на сторонах BC , CA и AB соответственно. С помощью теоремы Чевы несложно показать, что прямые AA_1 , BB_1 и CC_1 пересекаются в одной точке, которая называется *точкой Нагеля*. В данной задаче определяется аналогичное понятие для произвольного многоугольника.

- а1) Дан выпуклый четырехугольник $ABCD$. Вневписанные окружности к четырехугольнику касаются сторон BC , CD , DA и AB в точках A_1 , B_1 , C_1 и D_1 соответственно. Рассмотрим четырехугольник, вершинами которого являются точки пересечения отрезков AA_1 , BB_1 , CC_1 и DD_1 . Обозначим его через N_{ABCD} и назовем его *первым четырехугольником Нагеля*. Исследуйте зависимость свойств этого четырехугольника от свойств исходного четырехугольника. Например, найдите площадь N_{ABCD} , зная площадь $ABCD$, и т.п.
- а2) Можно также рассмотреть четырехугольник N'_{ABCD} , вершинами которого являются точки пересечения отрезков AB_1 , BC_1 , CD_1 и DA_1 . Назовем его *вторым четырехугольником Нагеля*. Сравните четырехугольники N_{ABCD} и N'_{ABCD} .
- б) Обобщите и исследуйте задачу для выпуклого n -угольника, где $n > 4$.

4. ЧЕТВЕРКИ ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ-БЛИЗНЕЦОВ

Два натуральных числа p и q называются *числами-близнецами*, если они оба просты и $q = p + 2$. Так, пары $(3, 5)$, $(5, 7)$, $(11, 13)$, $(17, 19)$ являются парами чисел-близнецов.

- а1) Найдите все натуральные n , для которых существуют числа-близнецы p и q такие, что $2^n + p$ и $2^n + q$ также являются числами-близнецами.
- а2) Дано натуральное число k . Верно ли, что существует только конечное число натуральных n , для которых найдется пара чисел-близнецов (p, q) такая, что $(k^n + p, k^n + q)$ также пара чисел-близнецов?
- б) Найдите все натуральные n , для которых существуют числа-близнецы p и q такие, что $2 \cdot 5^n + p$ и $2 \cdot 5^n + q$ также являются числами-близнецами.

- с) *Общая формулировка.* Даны натуральное число k и многочлен $P(x)$ с целыми коэффициентами. Верно ли, что существует только конечное число натуральных n , для которых найдется пара чисел-близнецов (p, q) такая, что $(P(k^n)+p, P(k^n)+q)$ также пара чисел-близнецов? Например, в пункте б) рассматриваются значения $k = 5$ и $P(x) = 2x$.

5. ДИНАМИКА ТОЧКИ, ДВИЖУЩЕЙСЯ К ВЕРШИНАМ МНОГОУГОЛЬНИКА

Задача по планиметрии, в которой рассматривается несложная динамическая система.

- а1) Точка P движется прямолинейно к вершине A треугольника ABC . На половине пути она сворачивает и движется к вершине B , на половине пути она сворачивает и движется к вершине C , на половине этого пути она снова сворачивает к A и т.д. Доказать, что существует треугольник, на который точка P стремится попасть. Построить этот треугольник и вычислить его площадь, если площадь треугольника ABC равна S .
- а2) Пусть n натуральное число. Решите предыдущую задачу для случая, когда точка P проходит $1/n$ часть пути к вершине и затем сворачивает к другой вершине.
- б) Та же задача для выпуклого четырехугольника $ABCD$. Заметьте, что здесь появляется несколько существенно отличных вариантов обхода вершин: A, B, C, D , или A, C, B, D , или A, C, D, B , ...
- с) Общая задача для выпуклого многоугольника.

6. ОДНОВРЕМЕННАЯ ДЕЛИМОСТЬ

В данной задаче речь идет о нахождении критериев, необходимых и достаточных для того, чтобы множества корней двух целочисленных уравнений (по модулю натурального числа) совпадали.

- а1) Докажите, что $3x + y$ кратно 13 тогда и только тогда, когда $5x + 6y$ кратно 13, где x и y – целые числа.
- а2) Дано натуральное число n . Описать множество целых чисел a, b, c и d , для которых выполняется следующее условие: числа $ax + by$ и $cx + dy$ делятся на n при одних и тех же целых значениях x и y .
- а3) Даны натуральные числа n и k . Описать множество целых чисел a_1, \dots, a_k , и b_1, \dots, b_k , для которых выполняется следующее условие: числа $a_1x_1 + \dots + a_kx_k$ и $b_1x_1 + \dots + b_kx_k$ делятся на n при одних и тех же целых значениях x_1, \dots, x_k .
- б) Дано натуральное число n . Описать множество целых чисел a, b, c и d , для которых выполняется следующее условие: числа $ax^2 + by^2$ и $cx^2 + dy^2$ делятся на n при одних и тех же целых значениях x и y .
- с) Исследуйте одновременную делимость других целочисленных выражений.

7. ВЛОЖЕНИЕ ОДНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА В ДРУГОЙ

Обозначим через P и Q треугольники с длинами сторонами p_1, p_2, p_3 и q_1, q_2, q_3 соответственно. Какие условия (необходимые и/или достаточные) нужно наложить на p_i и q_i , чтобы в треугольнике P можно было поместить треугольник Q ?

8. НАИБОЛЬШИЕ ХОРДЫ МНОГОУГОЛЬНИКОВ

Рассмотрим выпуклый n -угольник P с длинами сторон a_1, \dots, a_n . Обозначим через b_i длину наибольшей хорды P , параллельной i -ой стороне.

а) Докажите, что

$$\sqrt{8} < \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{b_i} \leq 4.$$

Когда выполняется равенство?

б) Верно ли, что

$$3 \leq \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{b_i} ?$$

в) Попытайтесь найти трехмерные аналоги этих неравенств.

(*Хордой* называется отрезок с концами на сторонах или в вершинах многоугольника.)

9. РЕПТИЛИИ

Назовем *n-рептилией* плоскую фигуру, которую можно разрезать на n одинаковых фигур, подобных исходной.

- Опишите все n -рептилии, являющиеся выпуклыми многоугольниками.
- Приведите примеры невыпуклых n -рептилий.
- Приведите примеры рептилий с "дырками".
- Существуют ли 2-рептилии, являющиеся одновременно 3-рептилиями?

10. ЧИСЛО ПОЦЕЛУЕВ ВЫПУКЛОЙ ФИГУРЫ

Числом поцелуев выпуклой фигуры P на плоскости называется наибольшее число копий фигуры, которые можно разместить вокруг P без наложений таким образом, чтобы все они касались P . Найдите числа поцелуев круга, треугольника, четырехугольника, и т.д.

11. МНОЖЕСТВО КРУГОВ БЕЗ ТРЕХ В ЛИНИЮ

Какого радиуса должен быть круг, чтобы в него можно было вложить n единичных кругов так, чтобы никакая прямая не пересекала более двух из них?

12. РАЗНОСТЬ ДВУХ РОВНА ОДНОМУ

Решите следующее уравнение

$$x^m - 2y^n = 1$$

в натуральных числах $x, y, m, n > 1$.

13. ЦЕЛЫЕ ЧАСТИ СТЕПЕНЕЙ

Рассмотрим последовательности вида $[(\frac{3}{2})^n]$ и $[(\frac{4}{3})^n]$, где n натурально.

- Докажите, что в каждой из этих последовательностей имеется бесконечно много составных чисел.
- Верно ли, что эти последовательности также содержат бесконечно много простых чисел?

14. ЗАДАЧА О СОСЕДЯХ

Диаметром многоугольника (необязательно выпуклого) называется наибольшее расстояние между двумя его точками.

- a) Квадрат со стороной 1 разбит на несколько выпуклых многоугольников. Предположим, что диаметр каждого многоугольника не превосходит $\frac{1}{30}$. Докажите, что найдется многоугольник P , у которого имеется не менее шести *соседей*, то есть многоугольников, касающихся P по крайней мере в одной точке.
- b) Задача пункта а) для общего случая, когда многоугольники разбиения необязательно выпуклы.
- c) Заменяем в условии пункта а) константу $\frac{1}{30}$ на положительное действительное число $\epsilon > 0$. Найдите наибольшее натуральное число $N(\epsilon)$ такое, что при любом разбиении квадрата со стороной 1 на выпуклые многоугольники диаметра $\leq \epsilon$, хотя бы у одного из многоугольников будет не менее $N(\epsilon)$ соседей.
- d) Задача пункта c) для случая, когда многоугольники разбиения необязательно выпуклы.

15. ПЕРЕСТАНОВКИ И ВЕРОЯТНОСТЬ

Пусть n – натуральное число. Обозначим через S_n и A_n соответственно симметрическую и знакопеременную группы перестановок чисел $1, 2, \dots, n$.

- a) Обозначим через p_n вероятность того, что случайно выбранная пара (s, t) перестановок из S_n порождает S_n или A_n . Докажите, что p_n стремится к 1, когда n стремится к бесконечности.
- b) Обозначим через $p_n(2)$ вероятность того, что случайно выбранная пара (s, t) перестановок из S_n , такая что коммутатор $[s, t] = sts^{-1}t^{-1}$ является транспозицией, порождает S_n или A_n . Верно ли, что $p_n(2)$ стремится к 1, когда n стремится к бесконечности?

16. ENGLISH VERSION OF SOME PROBLEMS

7. Fitting one triangle inside another. Let triangles P и Q have edge lengths p_1, p_2, p_3 and q_1, q_2, q_3 respectively. What are necessary and sufficient conditions on the p_i and q_i for P to contain a congruent copy of Q ?

8. Longest chords of polygons. Let P be a plane convex n -gon with side lengths a_1, \dots, a_n . Let b_i be the length of the longest chord of P parallel to the i th side.

a) Prove that

$$\sqrt{8} < \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{b_i} \leq 4.$$

When does the equality on the right hold?

b) Is it true that

$$3 \leq \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{b_i} ?$$

c) What are 3-dimensional analogs of these inequalities?

9. Reptiles. An n -reptile is a two dimensional region that can be tiled by n congruent tiles, each similar to the whole region.

- Describe all n -reptiles that are convex polygons.
- Give examples of non-convex n -reptiles.
- Give examples of reptiles with "holes".
- Does there exist a 2-reptile that is also a 3-reptile?

10. Kissing numbers of convex sets. The *kissing number* of a convex set P in the plane is the greatest number of disjoint congruent copies of P that can be arranged around P so that they all touch P . Find the kissing numbers of a disk, a triangle, a quadrilateral, etc.

11. Collections of disks with no three in a line. What is the radius of the smallest disk in which one can place n unit disks so that no straight line intersects more than two of them?

12. Difference of two gives one. Solve the following equation

$$x^m - 2y^n = 1$$

in integers $x, y, m, n > 1$.

13. Integer parts of powers. Consider the sequences $[(\frac{3}{2})^n]$ and $[(\frac{4}{3})^n]$ where n is a positive integer.

- Prove that there are infinitely many composite numbers in each of these sequences.
- Do the sequences also contain infinitely many primes?

14. A problem on neighbors The *diameter* of a polygon (not necessarily convex) is the greatest distance between any two of its points.

- a) A unit square is divided into convex polygons. Suppose that the diameter of each of these polygons does not exceed $\frac{1}{30}$. Prove that there is a polygon P with six or more neighbors, that is, polygons touching P in at least one point.
- b) The same problem in the general case that the polygons are not necessarily convex.
- c) Replace in a) the constant $\frac{1}{30}$ by a positive real number $\epsilon > 0$. Find the greatest positive integer $N(\epsilon)$ such that, for any partition of the unit square into convex polygons of diameter $\leq \epsilon$, at least one of these polygons would have $N(\epsilon)$ or more neighbors.
- d) The problem c) in the case that the polygons are not necessarily convex.

15. Permutations and probability. For a positive integer n , denote by S_n and A_n respectively the symmetric and the alternating groups of permutations of the numbers $1, 2, \dots, n$.

- a) Let p_n be the probability that a random pair (s, t) of permutations from S_n generate either S_n or A_n . Show that p_n tends to 1 as n tends to infinity.
- b) Let $p_n(2)$ be the probability that a random pair (s, t) of permutations from S_n , such that the commutator $[s, t] = sts^{-1}t^{-1}$ is a transposition, generate S_n or A_n . Is it true that $p_n(2)$ tends to 1 as n tends to infinity?

LABORATORY OF MATHEMATICS, UNIVERSITY PARIS-SUD 11, 91400 ORSAY, FRANCE
E-mail address: david.zmiaikou@gmail.com